

ការបន្តបែងចែកពេលសម្ភាគពោះវៀនដើម្បីឆ្លុះពិនិត្យផ្នែកខាងក្នុងពោះវៀនធំ ដោយប្រើថ្នាំ MOVIPREP - បញ្ជីពេលរសៀល
(Split Bowel Preparation Colonoscopy using MOVIPREP – AFTERNOON LIST)

មួយសប្តាហ៍មុនការឆ្លុះពិនិត្យផ្នែកខាងក្នុងពោះវៀនធំរបស់អ្នក: ការត្រៀមខ្លួន

1. ទិញថ្នាំ **Movicol** មួយប្រអប់ និងថ្នាំ **Moviprep** មួយប្រអប់ (មាន៖ 2 កញ្ចប់ - កញ្ចប់នីមួយៗមានកញ្ចប់តូច A និង B) ពីឱសថស្ថានក្នុងតំបន់របស់អ្នក (មិនចាំបាច់មានវេជ្ជបញ្ជាទេ)។
2. ឈប់លេបគ្រាប់ថ្នាំជាតិដែក Imodium/Lomotil/Gastrostop។
3. ប្រសិនបើអ្នកប្រើថ្នាំធ្វើឱ្យឈាមរាវ ដូចជា Warfarin, Pradaxa (Dabigatran), Xarelto (Rivaroxaban), Eliquis (Apixaban), Brilinta (Ticagrelor), Plavix, Iscover ឬ Piix (Clopidogrel) សូមជូនដំណឹងដល់គិលានុបដ្ឋាក ឬវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក។ អ្នកអាចបន្តប្រើថ្នាំអាស៊ីរីន ក្នុងអំឡុងពេលឆ្លុះពិនិត្យផ្នែកខាងក្នុងពោះវៀនធំ។
4. ប្រសិនបើអ្នកលេបថ្នាំការពារជំងឺទឹកនោមផ្អែម សូមជូនដំណឹងដល់គិលានុបដ្ឋាក ឬវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក។
5. ប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺខ្សោយបេះដូង ថ្លើម ឬកម្រងនោម សូមជូនដំណឹងដល់គិលានុបដ្ឋាក ឬវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក។ ការសម្ភាគពោះវៀននេះ ប្រហែលជាមិនសមស្របចំពោះអ្នកទេ។
6. ប្រសិនបើអ្នកប្រើថ្នាំបញ្ជា: ឈាមកជាទៀងទាត់ សូមបន្តប្រើថ្នាំនេះ។

បិទមុនការឆ្លុះពិនិត្យផ្នែកខាងក្នុងពោះវៀនធំរបស់អ្នក: កែប្រែរបបអាហាររបស់អ្នក

ជៀសវាង អាហារដែលមានសារជាតិសរសៃខ្ពស់ ដូចជាគ្រាប់ធញ្ញជាតិទាំងមូល និងប្លង់ដូត្រាប់ស្រូវសាលីទាំងមូល និងគ្រាប់ធញ្ញជាតិគ្រាប់ផ្លែឈើ (nuts) គ្រាប់ពូជ(seeds) ពពួកសណ្តែក ផ្លែឈើស្រស់ និងស្លឹក សាឡាត់ និងបន្លែឆ្អិន ហើយនឹងអាហារមានជាតិខ្លាំងៗទាំងអស់។

អាហារ**គួរ**ដែលមានសារជាតិសរសៃទាបត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបរិភោគ រួមមាននំប៉័ងស នំប៉័ងអាំង ស៊ុបផ្លា ឈើស សាច់ក្តៅជ្រូក ស៊ុត ត្រីចូណា សាច់មាន់ សាច់គ្មានជាតិខ្លាំងៗ ត្រី ដំឡូងបារាំង អង្ករស ល្ពៅ និងការ៉ូត។

មួយថ្ងៃមុនការឆ្លុះពិនិត្យផ្នែកខាងក្នុងពោះវៀនធំរបស់អ្នក: សម្ភាគពោះវៀនធំរបស់អ្នកជាមួយថ្នាំ MOVIPREP
អ្នកអាចពិសារអាហារពេលព្រឹកជាមួយអាហារដែលមានសារជាតិសរសៃទាប (ដូចខាងលើ)។

ចាប់ពីម៉ោង 12 ថ្ងៃក្រុង - ផឹកតែរត្តាវត្សាប៉ុណ្ណោះ មិនត្រូវពិសារអាហាររឺងទេ

ផឹកតែរត្តាវត្សាដែលបានយល់ព្រមប៉ុណ្ណោះ ទឹក ស៊ុបផ្លា ស៊ុបមាន់ផ្លា ទឹកផ្លែឈើ បាហ្វយ តែខ្មៅ និងការ៉ូត (កុំពិសារទឹកដោះគោ ឬផលិតផលធ្វើពី ទឹកដោះគោ) ភេសជ្ជៈក៏ឡា ភេសជ្ជៈកាបូណាត រត្តលាយសម្រាប់ផឹកជំនួសការបាត់បង់ជាតិអំបិល និងទឹក (oral rehydration salts)

ឧទាហរណ៍ **Hydrolite** និង **ORS**។ ផឹកតែរត្តាវត្សាឱ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ 10 កែវ ដើម្បីរក្សាជាតិទឹកក្នុងដងខ្លួន។

PLEASE TURN OVER NEXT PAGE
សូមបើកទំព័របន្ទាប់

ម៉ោង 5 ល្ងាច (ប្រហែល)៖ កម្រិតដំបូងនៃថ្នាំ Moviprep៖



បន្ថែមចំណុះកញ្ចប់ទាំងមូល (មានកញ្ចប់តូច A និង B) ក្នុងទឹកក្ដៅឧណ្ហៗ 1 លីត្រ ហើយកូររហូតដល់រលាយ។ ដាក់ក្នុងទូទឹកកឱ្យត្រជាក់ រយៈពេលកន្លះម៉ោងមុននឹងផឹក។

ផឹករត្នលាយនេះយឺតៗ ប៉ុន្តែតែឱ្យបានអស់ទាំងស្រុងក្នុងរយៈពេល 2 ទៅ 3 ម៉ោងបន្ទាប់។

ការសម្អាតពោះវៀននេះអាចបណ្តាលឱ្យមានការចុះរាកច្រើនដងក្នុងរយៈពេល 2 ទៅ 3 ម៉ោង បន្ទាប់ពីបានផឹកកម្រិតថ្នាំដំបូង។ ការចុះរាកចំពោះបុគ្គលម្នាក់ៗអាចកើតមានខុសគ្នា។ រក្សានៅទីកន្លែងដែលអាចទៅបង្គន់បានដោយងាយស្រួល។

នៅថ្ងៃឆ្លុះពិនិត្យផ្នែកខាងក្នុងពោះវៀនជំរុំរបស់អ្នក

ម៉ោង 7 ព្រឹក កម្រិតថ្នាំទីពីរ៖ សូមធ្វើតាមការណែនាំដូចកម្រិតថ្នាំទីមួយខាងលើ។

បន្តផឹករត្នរាវរហូតដល់ម៉ោង 10 ព្រឹក។

ឈប់ផឹករត្នរាវនៅម៉ោង 10 ព្រឹក

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ អំពីការណែនាំស្តីពីការសម្អាតពោះវៀន សូមទូរស័ព្ទមកមន្ទីរព័ត៌មានព្រះពោះវៀន នៅមន្ទីរពេទ្យ Liverpool តាមទូរស័ព្ទលេខ 8738 4085។

<https://www.gastroliverpool.com.au/preparation-for-colonoscopy.html>

